



Papillomavirus et risques de cancers

Testez vos connaissances !

Le Papillomavirus (HPV) peut être responsable :

- De cancer de la prostate
- De vols nocturnes de Papillons en milieu urbain
- De cancer du col de l'utérus, gorge, anus, vulve

2) Être contaminé par un Papillomavirus (HPV) lors d'un rapport sexuel...

- Conduit à une élimination naturelle de ce virus par l'organisme dans 90% des cas.
- Est un facteur de risque pour un futur cancer
- Prouve qu'on n'a pas utilisé de préservatifs

3) La Vaccination contre le Papillomavirus (HPV) par GARDASIL 9

- Est obligatoire dès la naissance
- Est recommandée chez tous les Ados dès 11 ans
- Est inutile avant le début de la vie sexuelle

4) Le nombre de décès en France par cancer du col est estimé à

- Il n'y a plus de décès liés à ce cancer
- Environ 1000 femmes par an
- Seulement 5 cas en 2024.

5) Être vaccinée par GARDASIL 9 contre le Papillomavirus (HPV) :

- Me permet d'éviter 9 cancers sur 10 liés à l'HPV
- Me permet d'avoir des rapports sexuels non protégés
- Me dispense de tout suivi ultérieur par mon Gynécologue (pas de Frottis !)

6) Le suivi gynécologique chez la femme consiste en (plusieurs réponses) :

- Un frottis cervico-utérin de 25 à 30 ans
- Une recherche de l'HPV par voie vaginale de 30 à 65 ans
- Une vaccination Gardasil annuelle de 25 à 65 ans



Plus d'infos sur
jefaismondepistage.e-cancer.fr

La
CPTS
Monts
& **Barrages**



vous invite à une marche pour parler
Santé et Prévention



Dépistage du
cancer du col de l'utérus




Le **papillomavirus (HPV)** est un virus transmis lors des rapports sexuels.

Sa persistance dans le corps (10% des cas) peut être à l'origine de **cancers : col de l'utérus** (le plus fréquent), gorge, anus, vulve.

La **prévention** grâce à l'usage du **préservatif** est primordiale (comme pour toutes les autres Infections Sexuellement Transmissibles), mais elle est **imparfaite** pour la Papillomavirus car il ne couvre pas toutes les parties génitales.

La prévention des maladies liées au Papillomavirus repose donc en plus, sur la **vaccination à l'adolescence**, et le **dépistage chez les femmes à l'âge adulte**.



Papillomavirus (HPV) et risque de cancers : infos, recos

Le papillomavirus (HPV) est un virus transmis lors des rapports sexuels.

Il est généralement contracté lors des **premiers rapports**. Dans la majorité des cas, il est progressivement éliminé par l'organisme .

Sa persistance dans le corps (10% des cas) peut être à l'origine de cancers : col de l'utérus (le plus fréquent), gorge, anus, vulve.

En France, 6 400 cancers sont liés chaque année aux virus HPV, dont un sur quatre chez les hommes.

Les cancers du col de l'utérus sont responsables d'environ 1000 décès par an en France.

Prévention

La prévention grâce à l'usage du **préservatif est primordiale (comme pour toutes les autres Infections Sexuellement Transmissibles)**, mais elle est **imparfaite** pour le Papillomavirus car il ne couvre pas toutes les parties génitales.

La prévention des maladies liées au Papillomavirus repose donc en plus, sur la vaccination à l'adolescence, et le dépistage chez les femmes à l'âge adulte.

Vaccination (Gardasil 9) :

recommandée chez les adolescent.e.s à partir de 11 ans

De 11 à 14 ans : schéma à 2 doses à six mois d'intervalle (M0-M6).

Après 14 ans (jusqu'à 19 ans, voire 26 ans) : schéma à 3 doses sur 6 mois (M0, M2, M6).

Selon les études scientifiques, la vaccination permettrait d'éviter 9 cas de cancer sur 10 liés au Papillomavirus. Même vaccinées, toutes les femmes sont donc invitées pour des tests de dépistages réguliers au cours de leur vie.



Dépistage du Papillomavirus

Recommandé chez toutes les femmes de 25 à 65 ans

• De 25 à 30 ans :

Par un prélèvement (Frottis Cervico-Utérin (FCU)) réalisé par un professionnel de santé (médecin, sage femme ou biologiste) par voie vaginale. Ce test est fait tous les 3 ans si les deux premiers (effectués à un an d'écart) sont négatifs.

• De 30 à 65 ans : tous les 5 ans

Par un prélèvement cervico-utérin réalisé par un professionnel de santé (médecin, sage femme ou biologiste) par voie vaginale.

ou

Par un autoprélèvement vaginal (APV) à réaliser soi-même, recommandé actuellement pour les femmes insuffisamment ou non dépistées.




Sources :

World Health Organization : <https://screening.iarc.fr/atlasHPVfrdetail.php?Index=0338e=>


Haute Autorité de Santé - https://www.has-sante.fr/jcms/c_2806160/fr/evaluation-de-la-recherche-des-papillomavirus-humains-hpv-en-depistage-primaire-des-lesions-precancereuses-et-cancereuses-du-col-de-l-uterus-et-de-la-place-du-double-immuno-marquage-p16/ki67

Centre National de Référence papillomavirus - <https://cnr-hpv.fr/2022/05/16/test-hpv-et-auto-prelevement/>

Vaccination Info Service - <https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Infections-a-Papillomavirus-humains-HPV>



Frottis Cervico-Utérin



Autoprélèvement Vaginal