



Éléments d'observation à renseigner à tout âge

À compléter intégralement

UN OU PLUSIEURS FACTEURS DE RISQUE

Recommandations HAS sur les troubles du neurodéveloppement, 2020

☐ Oui

☐ Non

☐ Prématurité (à préciser ci-dessous)

☐ Poids de naissance inférieur à 1500 g

☐ Frère ou sœur ou parent de 1^{er} degré ayant un TND

☐ Exposition prénatale importante à un toxique (alcool, drogues) ou à un traitement médicamenteux (certains antiépileptiques, certaines substances psychoactives ou autres)

☐ Affections néonatales sévères (anoxie néonatale, encéphalopathies aigües néonatales incluant convulsions, cardiopathies congénitales complexes opérées ou non, autre chirurgie néonatale lourde, anomalies cérébrales de pronostic incertain, microcéphalie (périmètre crânien < -2 DS, congénitale ou secondaire), infections congénitales ou néonatales, ictère néonatal sévère)

☐ Syndromes génétiques

Si vous avez coché une ou plusieurs cases, merci de mentionner les précisions ci-dessous :

.....

.....

.....

.....

.....

.....



REGRESSION DE COMPETENCES ACQUISES :

préciser lesquelles et sur quelle période :

- ☐ **Oui** : si une perte objective et persistante d'acquisition antérieure est constatée, l'enfant doit être orienté en urgence vers une consultation hospitalière de pédiatrie ou neuropédiatrie (éventuellement avec l'appui de la plateforme).

☐ **Non**

COMPORTEMENTS INSTINCTUELS, SENSORIELS, EMOTIONNELS PARTICULIERS

Difficultés sévères et durables de sommeil et/ou d'alimentation :

☐ **Oui**

☐ **Non**

- ☐ Troubles durables et quasi quotidiens du sommeil (endormissement difficile et tardif, réveils nocturnes réguliers).
- ☐ Grande sélectivité alimentaire (aversion pour certaines textures alimentaires et/ou refuse les morceaux, et/ou aversion pour les aliments d'une certaine couleur).
- ☐ Difficultés de prises alimentaires (réflexe nauséeux massif, prise des biberons ou des repas excessivement longue et peu efficace...).



Détecter les signes d'un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans

Profil sensoriel et sensorimoteur particulier :

☐ Oui

☐ Non

- ☐ Fascination pour les lumières et/ou objets qui tournent.
- ☐ Hyper – ou hypo – réactivité à certains sons et/ou textures et/ou odeurs.
- ☐ Indifférence ou réaction excessive à la douleur.
- ☐ Recherche de stimulations sensorielles (cutanées, lumineuses, olfactives...).

Comportements et intérêts inhabituels :

☐ Oui

☐ Non

- ☐ Comportement anormalement calme voire passif, bougeant très peu (hypo-mobilité) pour les enfants de moins de 24 mois.
- ☐ Exploration / utilisation inhabituelle des « objets » et de l'environnement.
- ☐ Mouvements répétitifs stéréotypés gestuels ou corporels (balancements, tournoiements, déambulations, battements des mains, mouvements des doigts devant les yeux...).



Difficultés à se contrôler et/ou à réguler ses émotions :

☐ Oui

☐ Non

☐ Intolérance exagérée au changement de l'environnement (réactions de peur et anxiété disproportionnées ou sans objet apparent, non apaisibles et répétées).

☐ Colères violentes, répétées, inconsolables et frustrations.

☐ Hyperactivité motrice incontrôlable (se met en danger).

☐ Opposition forte et assez systématique aux adultes.

.....

.....

.....

.....

.....

Inquiétude des parents :

☐ Oui

☐ Non

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....





Détecter les signes d'un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans

Inquiétude des professionnels de la petite enfance ou de l'école, notamment comportement dans le collectif et/ou difficultés d'apprentissages pré-élémentaires

☐ Oui

☐ Non

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

